



## Riesgo de TBE en Alemania y Austria

**La Encefalitis Transmitida por Garrapatas (TBE por sus siglas en inglés)** es una inflamación del cerebro. Es de transmisión viral. La infección sucede por la mordida de una garrapata infectada con el virus TBE. En las regiones donde ocurre la TBE entre 1 y 5% de las garrapatas son portadoras del virus.

El **mapa** muestra la distribución. De viajar en el verano a estas zonas, se debe uno informar meticulosamente sobre las medidas de protección.

Los mapas de Austria y Europa

Oriental se encuentran en:

[www.reisemed.at](http://www.reisemed.at)

Existe una **vacuna** con buena con buena eficacia contra la TBE.

La vacuna está disponible en el consultorio médico regional. La vacunación se aplica con el siguiente esquema: Inicial, con un intervalo de 2 – 4 semanas; seguido por un refuerzo después de 9-12 meses. La protección empieza desde la segunda vacunación parcial y al finalizar el esquema se logra una protección de 3 – 5 años.

La vacuna es bien tolerada. Ocasionalmente se pueden presentar enrojecimientos en el sitio de la inyección e inflamación; también es posible que haya reacciones generales ligeras con fiebre. Rara vez existen reacciones generales más severas o alérgicas con dolores articulares y musculares. Sólo en casos aislados ha habido reportes de enfermedades nerviosas o autoinmunes respectivamente.

Este riesgo existe de cualquier manera con cualquier otra vacuna.

De viajar **sin vacuna** a las regiones de riesgo, aún así se puede proteger. Déjese asesorar por el equipo médico regional y que le informe del concepto **NoBite®**. La combinación de un repelente para la piel y la impregnación específica de sus ropas de excursión, le asegura protección prolongada de las picaduras de mosquitos y mordeduras de garrapatas.

**Su equipo médico regional le desea un buen viaje. Permanezca saludable!**

